Acetocaustin®

Warzenvereiser gegen Warzen und Dornwarzen

BITTE LESEN SIE DIE PACKUNGSBEILAGE SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DEN ACETOCAUSTIN WARZENVEREISER GEGEN WARZEN UND DORNWARZEN ANWENDEN. WIR EMPFEHLEN IHNEN, DIESE PACKUNGSBEILAGE GUT AUFZUBEWAHREN, UM SIE BEI BEDARF NOCH EINMAL ZU KONSULTIEREN.

1. INHALT DES ACETOCAUSTIN WARZENVEREISERS GEGEN WARZEN UND DORNWARZEN
Ein unter Druck stehender Behälter mit 50 ml (zum Zeitpunkt der Herstellung) des komprimierten Flüssiggases Dimethylether. Ein spezieller Applikator wird zum Übertragen der Kälte des Kältemittels auf die Warze verwendet.

2. HINTERGRUNDINFORMATIONEN ZU WARZEN
Warzen sind Wucherungen auf der Haut oder den Schleimhäuten (z. B. im Mund-, Nasen-, Anus-, Genitalien- oder Lippenbereich), die durch das humane Papillomavirus (HPV) verursacht werden. Es gibt mehr als 80 verschiedene HPV-Typen. Viele von ihnen werden von der Haut aufgenommen und verursachen dort verschiedene Hautwarzen wie Dornwarzen und gewöhnliche Warzen.

Dornwarzen ähneln gewöhnlichen Warzen, treten aber nur an der Fußsohle oder an der Unterseite der Zehen auf. Sie sind in der Regel schmerzhaft und erscheinen oft wie kleine weiße Hautringe, die schwarze Punkte umgeben. Dornwarzen sind außerdem ansteckend und können durch den Kontakt mit feuchten Oberflächen wie Fußböden auf andere Personen übertragen werden. Andere Varianten des Virus werden von den Schleimhäuten aufgenommen, wo sie Warzen an den Genitalien oder am Anus verursachen können.

Hautwarzen wie gewöhnliche Warzen und Dornwarzen sind in der Regel harmlos. Genitalwarzen werden jedoch mit Gebärmutterhalskrebs in Verbindung gebracht. Von Warzen sind 7 bis 10 % der Bevölkerung betroffen. Sie treten am häufigsten bei Kindern und Jugendlichen auf. Warzen sind sehr ansteckend und können häufiger auftreten, wenn das Immunsystem geschwächt ist.

Warzen werden von Mensch zu Mensch übertragen oder können bei ein und derselben Person durch Berührung oder Kontakt mit Hautschuppen auf andere Körperstellen übergreifen. Mehr als 50 % aller Warzen verschwinden innerhalb von zwei Jahren von selbst, wenn sie nicht behandelt werden. Sie sind jedoch unansehnlich und können im Falle von Dornwarzen Schmerzen verursachen. Daher entscheiden sich viele Patienten dafür, ihre Warzen zu behandeln, anstatt zu warten, bis sie verschwinden.

Warzen können mit verschiedenen topischen Säurepräparaten, durch chirurgische Entfernung sowie Verbrennung oder Kryotherapie (Vereisen) behandelt werden. Die am häufigsten angewandte Kryotherapie beruht auf flüssigem Stickstoff, wird jedoch nur von einem Arzt durchgeführt. Der Acetocaustin Warzenvereiser gegen Warzen und Dornwarzen ist eine Alternative zu flüssigem Stickstoff.

3. WOFÜR WIRD DER ACETOCAUSTIN WARZENVEREISER GEGEN WARZEN UND DORNWARZEN ANGEWENDET?
Bestimmungsgemäße Verwendung: Acetocaustin Behandlung gegen Warzen wird zur rezeptfreien Behandlung von gewöhnlichen Warzen und Dornwarzen bei Patienten ab 4 Jahren angewendet.

Gewöhnliche Warzen und Dornwarzen sind harmlose Wucherungen, die im Inneren aus Lederhaut (oder Bindegewebe) mit Blutgefäßen bestehen, das von Schichten der Oberhaut (oder Epidermisgewebe) bedeckt ist.
Gewöhnliche Warzen sind hautfarben, treten in der Regel an Händen und Füßen auf und sind leicht an der rauen, „blumenkohlartigen" Oberfläche zu erkennen.

Dornwarzen treten nur an der Fußsohle auf und sind durch den Druck beim Gehen oft flach. Dornwarzen wachsen nach innen, sind oft verhornt und können sehr schmerzhaft sein. Das Fußabdruckmuster ist im Bereich der Warzen glatt, da die „Hautlinien" nicht über die Oberfläche der Warzen verlaufen.

4. WIE WIRKT DER ACETOCAUSTIN WARZENVEREISER GEGEN WARZEN UND DORNWARZEN?
Der Acetocaustin Warzenvereiser gegen Warzen und Dornwarzen vereist punktuell Warzen an Fingern, Händen und Füßen. Durch das Vereisen wird das betroffene Gewebe zerstört. Der Applikator wird zuerst gekühlt und dann auf die Warze gedrückt (appliziert). Die Vereisung beginnt innerhalb weniger Sekunden und die Haut färbt sich weiß (siehe Abbildung und Gebrauchsanleitung). Das Vereisen geht mit einem leicht schmerzenden, juckenden und/oder stechenden Gefühl einher.

Nach dem Entfernen des Applikators kehrt die Farbe zurück und das schmerzende, juckende und/oder stechende Gefühl sollte schnell abnehmen und innerhalb weniger Stunden ganz verschwinden.

Nachdem der Bereich aufgetaut ist und die Farbe zurückkehrt, kann eine Rötung in der Größe der vereisten Stelle auftreten. Durch das Vereisen kann sich innerhalb weniger Tage eine (Blut-)Blase unter der Warze bilden. Das ist unter Umständen nicht einfach zu erkennen. Die gefrorene Haut mit der behandelten Warze fällt nach etwa 10–14 Tagen ab. In der Zwischenzeit bildet sich unter der Blase neue Haut.

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender niedergelassen ist, zu melden.

Weitere Informationen über den Acetocaustin Warzenvereiser gegen Warzen und Dornwarzen finden Sie unter www.acetocaustin.de.
Wenden Sie sich bei Fragen zum Produkt bitte an den Lieferanten.

Weitere Informationen und ein Anleitungsvideo finden Sie unter www.acetocaustin.de

TheOTCLab
Fred. Roeskestraat 115
1076 EE Amsterdam
Niederlande
www.theotclab.com

5. HINWEISE ZUR ANWENDUNG BEI GEWÖHNLICHEN WARZEN
1. Den Fuß oder die Hand mit der Warze 5 Minuten lang in warmes Wasser tauchen. Danach gründlich abtrocknen.
2. Die Sprühdose auf einen harten Untergrund stellen. Den Applikator mit der Metallspitze nach unten auf die Sprühdose setzen. Den Applikator nicht nach unten drücken, bevor er bereit zum Kühlen ist.
3. Den Applikator 5 Sekunden lang nach unten drücken. Den Behälter anschließend 5 Sekunden lang stehen lassen. (Nicht länger als angegeben drücken und vor der neuerlichen Aktivierung mindestens 5 Minuten warten.)
4. Den Applikator mit der Metallspitze nach unten aus der Sprühdose entfernen. Achtung, die Metallspitze nicht berühren.
5. Die Metallspitze maximal 20 Sekunden lang auf die Warze drücken. Darauf achten, dass die Metallspitze die Warze so gut wie möglich bedeckt.
6. Nach der Anwendung sofort die Hände waschen (bei Anwendung an der Hand mit Ausnahme des behandelten Bereichs).
7. Wenn das Produkt von mehr als einer Person verwendet wird sowie nach jeder Anwendung den Applikator mit einem kleinen Tuch und etwas Alkohol reinigen.

Es ist wichtig, dass die Anweisungen auf der Packungsbeilage genau befolgt werden. Bei unvorsichtigem Gebrauch kann es zu einer zu tiefen Vereisung kommen, die die oberste Hautschicht an Fingern und Zehen dauerhaft beschädigt. Dies kann zu bleibenden Narben oder Nervenschäden führen.

Zum Schutz der empfindlichen Warzenregion nach Abschluss der Behandlung können Komfortpolster (nicht in der Verpackung des Acetocaustin Warzenvereisers gegen Warzen und Dornwarzen enthalten) verwendet werden.

6. HINWEISE ZUR ANWENDUNG BEI DORNWARZEN
Den Fuß mit der Fußsohlenwarze 5 Minuten lang in warmes Wasser tauchen. Danach gründlich abtrocknen. Die Dornwarze mit einem Bimsstein oder einer Bimsfeile (nicht in der Verpackung von Acetocaustin Kältebehandlung gegen Warzen und Dornwarzen enthalten) abreiben, bevor der Acetocaustin Warzenvereiser gegen Warzen und Dornwarzen angewendet wird.

Die Sprühdose auf einen harten Untergrund stellen. Den Applikator mit der Metallspitze nach unten auf die Sprühdose setzen. Den Applikator nicht nach unten drücken, bevor er bereit zum Kühlen ist. Den Applikator 5 Sekunden lang nach unten drücken. Den Behälter anschließend 5 Sekunden lang stehen lassen. (Nicht länger als angegeben drücken und vor der neuerlichen Aktivierung mindestens 5 Minuten warten.)

Den Applikator mit der Metallspitze nach unten aus der Sprühdose entfernen. Achtung, die Metallspitze nicht berühren.
Die Metallspitze maximal 40 Sekunden lang auf die Dornwarze drücken. Darauf achten, dass die Metallspitze die Warze so gut wie möglich bedeckt.

Nach der Anwendung sofort die Hände waschen (bei Anwendung an der Hand mit Ausnahme des behandelten Bereichs).
Wenn das Produkt von mehr als einer Person verwendet wird sowie nach jeder Anwendung den Applikator mit einem kleinen Tuch und etwas Alkohol reinigen.

7. WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE & EINSCHRÄNKUNGEN
Lesen Sie diese wichtigen Informationen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

WARNHINWEISE
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Die Anweisungen zur ordnungsgemäßen Anwendung dieses Produkts sind für Kinder nicht verständlich. Der Inhalt ist eine Gefahr bei Verschlucken, Einatmen, Versprühen oder Hitzeeinwirkung. Nur zur äußerlichen Anwendung. Nur nach Vorschrift verwenden. Eine unsachgemäße Verwendung des Acetocaustin Warzenvereisers gegen Warzen und Dornwarzen, ein direktes Auftragen auf die Haut und eine Behandlung von Hautproblemen, bei denen es sich nicht um Warzen handelt, können zu schweren Verbrennungen und dauerhafter Narbenbildung der Haut führen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie nicht ausreichend gut sehen können, um die Informationen auf dem Behältnis oder diese Packungsbeilage zu lesen.

WIE DER ACETOCAUSTIN WARZENVEREISER GEGEN WARZEN UND DORNWARZEN ANGEWENDET WIRD



Die Sprühdose auf einen harten Untergrund stellen. Den Applikator mit der Metallspitze nach unten in den oberen Teil der Sprühdose stecken.
Den Applikator nicht nach unten drücken, bevor er bereit zum Kühlen ist.



Den Applikator 5 Sekunden lang nach unten drücken.
Nicht länger als angegeben drücken und mindestens 5 Minuten warten, bevor Sie das Gerät wieder aktivieren.



Den Behälter mit dem Applikator 5 Sekunden lang stehen lassen.
Danach den Applikator von der Sprühdose entfernen. Achtung, die Metallspitze nicht berühren.



Die Metallspitze 20 Sekunden lang auf die Warze halten (bei Dornwarzen 40 Sekunden lang).
Darauf achten, dass die Metallspitze die Warze oder Dornwarze so gut wie möglich bedeckt.

20 sec 40 sec

50ml MD 0482

- Nicht länger als angegeben drücken und mindestens 5 Minuten warten, bevor Sie das Gerät wieder aktivieren. Wenn Sie den Applikator länger als vorgeschrieben drücken, kann überschüssiges Produkt freigesetzt werden, was sich aufgrund eines gestörten Gleichgewichts zwischen Produkt und Gasfreisetzung als Leckage bemerkbar machen kann.
- Nicht bei Kindern unter 4 Jahren anwenden. Es ist nicht bekannt, welche Auswirkungen der Acetocaustin Warzenvereiser gegen Warzen und Dornwarzen auf die Haut von Kindern hat.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit gesunder Haut. Eine Anwendung auf gesunder Haut kann Verbrennungen und dauerhafte Narbenbildung verursachen.
- Kontakt mit den Augen vermeiden. Augenkontakt kann zum Erblinden führen. Augen nicht reiben oder mit den Händen berühren, nachdem Sie den Acetocaustin Warzenvereiser gegen Warzen und Dornwarzen auf Ihren Händen angewendet haben. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn das Produkt mit Ihren Augen in Kontakt kommt.
- Verwenden Sie das Mittel nicht, wenn Sie die zu behandelnde Warze nicht deutlich sehen können. Wenn Sie den Acetocaustin Warzenvereiser gegen Warzen und Dornwarzen versehentlich auf Stellen verwenden, bei denen es sich nicht um Warzen handelt, kann dies zu schweren Verbrennungen und dauerhaften Narben auf der Haut führen.
- Nicht schlucken oder einatmen. Der Inhalt ist giftig und kann schwere innere Schäden verursachen. Suchen Sie bei Verschlucken sofort einen Arzt auf.
- Atmen Sie den Dampf/Sprühnebel nicht ein und verwenden Sie das Mittel nur in gut belüfteten Räumen, da nicht bekannt ist, wie sich der Dampf/Sprühnebel auf die Lunge auswirkt. Das Einatmen der Dämpfe/des Sprühnebels kann giftig sein.
- Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Während der Anwendung des Acetocaustin Warzenvereisers gegen Warzen und Dornwarzen nicht rauchen. Durch Hitzeeinwirkung kann der Behälter explodieren und schwere Verletzungen verursachen.
- Die Sprühdose nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach dem Gebrauch. Vor Sonneneinstrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C (122 °F) aussetzen. Bei Raumtemperatur aufbewahren und vor Hitze schützen. Durch Hitzeeinwirkung kann der Behälter explodieren und schwere Verletzungen verursachen.
- Die Spitze des Applikators enthält Nickel. Anwender mit einer Nickelallergie sollten vor mehrmaliger Behandlung sorgfältig prüfen, ob eine allergische Reaktion auftritt.

EINSCHRÄNKUNGEN
- Nicht an Stellen mit dünner Haut wie Gesicht, Achselhöhlen, Brüsten, Po oder Genitalien anwenden. Die Anwendung an diesen Stellen kann Verbrennungen und dauerhafte Narbenbildung verursachen.
- Nicht auf gereizter Haut oder auf infizierten oder geröteten Stellen sowie Hautpartien anwenden, die Anzeichen einer Entzündung wie Juckreiz oder Schwellung aufweisen. Die Behandlung solcher Bereiche mit dem Acetocaustin Warzenvereiser gegen Warzen und Dornwarzen führt zu einer Verschlechterung des Zustands und möglicherweise zu einer weiteren Infektion. Bei diesen Erkrankungen handelt es sich möglicherweise nicht um Warzen und Sie sollten sich ärztlich untersuchen lassen.
- Nicht anwenden bei Leberflecken, Muttermalen, Warzen mit Haarwuchs, Genitalwarzen (am Penis oder im Vaginalbereich), Warzen im Gesicht oder auf den Schleimhäuten (z. B. im Mund, in der Nase, am Anus, im Genitalbereich, auf den Lippen, in den Ohren oder in Augennähe). Die Anwendung an diesen Stellen kann zu Verbrennungen und dauerhaften Vernarbungen der Haut oder zum Erblinden führen.
- Behandeln Sie jede Warze nicht öfter als insgesamt dreimal mit dem Acetocaustin Warzenvereiser gegen Warzen und Dornwarzen, da die Behandlung möglicherweise nicht wirksam ist und Verbrennungen und dauerhafte Narbenbildung verursachen kann.
- Bei mehr als einer Warze an einem Finger oder Zeh nie mehr als eine Warze gleichzeitig behandeln. Wenn Sie mehrere Warzen an einem Finger oder Zeh gleichzeitig vereisen, kann es länger dauern, bis die Stelle abheilt. Im schlimmsten Fall heilt die Stelle möglicherweise nicht richtig ab. Behandeln Sie bei mehreren Warzen an einem Finger oder einem Zeh die Warzen separat und halten Sie möglichst einen zweiwöchigen Abstand zwischen den Behandlungen ein.

Bei Zweifeln fragen Sie Ihre Ärztin oder Ihren Arzt. Wenn Sie eine Hauterkrankung mit dem Acetocaustin Warzenvereiser gegen Warzen und Dornwarzen behandeln, bei der es sich nicht um eine Warze handelt, verzögern Sie die richtige Behandlung. Diese Verzögerung kann zu einer ernsteren Hauterkrankung führen.

WARNUNGEN
- Das Produkt nicht nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden. Die Chargennummer und das Verfallsdatum befinden sich auf der Unterseite der Sprühdose sowie auf der Außenseite der Verpackung.
- Wenn das Produkt von mehr als einer Person verwendet wird sowie nach jeder Anwendung den Applikator mit einem kleinen Tuch und etwas Alkohol reinigen. Bei unsachgemäßer Reinigung kann es zu einer Kreuzkontamination mit dem Virus kommen.
- In den meisten Fällen ist für jede Warze nur eine Behandlung erforderlich. Warzen sind in der Regel innerhalb von zwei Wochen nach der Behandlung mit dem Acetocaustin Warzenvereiser gegen Warzen und Dornwarzen verschwunden. Wenn eine Warze oder ein Teil davon zwei Wochen nach der Behandlung noch nicht verschwunden ist, können Sie die Behandlung gefahrlos wiederholen. Behandeln Sie jede Warze maximal dreimal mit dem Acetocaustin Warzenvereiser gegen Warzen und Dornwarzen. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn nach drei Behandlungen noch keine Verbesserung eingetreten ist.
- Das schmerzende/stechende Gefühl nach der Behandlung von gewöhnlichen Warzen sollte innerhalb weniger Stunden nach der Anwendung verschwinden. Bei Dornwarzen kann das schmerzende/stechende Gefühl 24 Stunden anhalten. Wenn die Beschwerden oder das schmerzende/stechende Gefühl bei gewöhnlichen Warzen nach 3 Stunden bzw. bei Dornwarzen nach 24 Stunden weiterhin anhalten, wenden Sie sich an Ihre Ärztin oder Ihren Arzt. Dies kann bedeuten, dass der Bereich zu tief vereist wurde und ärztliche Hilfe erforderlich ist.
- Nach der Anwendung sofort die Hände waschen (bei Anwendung an der Hand mit Ausnahme des behandelten Bereichs). Das sofortige Waschen der behandelten Stelle kann unangenehm sein, da Sie möglicherweise noch Schmerzen und Stechen verspüren. Die behandelte Stelle kann nach Abklingen des Schmerzes/ Stechens gewaschen werden.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Anwendung sorgfältig. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt erscheint. Entsorgen Sie es in diesem Fall. Aus einem beschädigten Produkt kann Gas austreten.

GEGENANZEIGEN:
- Verwenden Sie das Mittel nicht, wenn Sie Diabetiker sind oder eine schlechte Durchblutung haben. Der Acetocaustin Warzenvereiser gegen Warzen und Dornwarzen wirkt durch Vereisung der Warze. Bei Diabetikern und Menschen mit schlechter Durchblutung heilt der vereiste Bereich möglicherweise langsam und nicht vollständig ab.
- Verwenden Sie das Mittel nicht, wenn Sie schwanger sind oder stillen. Es ist unbekannt, wie sich Acetocaustin Kältebehandlung gegen Warze und Dornwarzen auf schwangere oder stillende Frauen auswirkt.

NEBENWIRKUNGEN
Bei der Anwendung des Produkts können folgende Nebenwirkungen auftreten:
- Ein stechendes, juckendes, schmerzendes Gefühl während und nach dem Vereisen, das nach dem Erwärmen der Stelle schnell nachlässt.
- Veränderung der Hautfärbung von Weiß nach Rot.
- Blasenbildung.
- Nach ein paar Tagen können schwarze Punkte in der Mitte der Warze erscheinen.s.

8. NACHBEHANDLUNG
Bei gewöhnlichen Warzen ist in den meisten Fällen nur eine Behandlung erforderlich. Bei Dornwarzen kann mehr als eine Behandlung erforderlich sein. Innerhalb von zwei Wochen nach der Behandlung mit Acetocaustin Warzenvereiser gegen Warzen und Dornwarzen sind gewöhnliche Warzen in der Regel verschwunden. Wenn eine Warze oder ein Teil davon zwei Wochen nach der Behandlung immer noch vorhanden ist, können Sie eine weitere Behandlung durchführen.

Behandeln Sie jede Warze maximal dreimal mit dem Acetocaustin Warzenvereiser gegen Warzen und Dornwarzen. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn nach drei Behandlungen noch keine Verbesserung eingetreten ist. Wenden Sie den Acetocaustin Warzenvereiser gegen Warzen und Dornwarzen nicht zusammen mit einer anderen Methode zur Warzenentfernung an, da nicht bekannt ist, wie sich die Kombination auf Ihre Haut auswirkt. Eine Kombination mehrerer Anwendungen kann zu schweren Verbrennungen und dauerhaften Narbenbildungen auf der Haut führen.

Nach der Anwendung kann sich die Haut von Weiß nach Rot verfärben, unter der Warze kann sich eine Blase bilden und normalerweise tritt für einige Stunden ein schmerzendes/ stechendes Gefühl auf. Wenn das schmerzende, stechende Gefühl bis zum nächsten Tag anhält oder ein anderes Problem auftritt (z. B. Erfrierungen der Haut über die Fläche der Warze hinaus oder ein Taubheitsgefühl), wenden Sie sich bitte an Ihre Ärztin oder Ihren Arzt.

- Es ist normal, dass die behandelte Stelle einige Tage lang empfindlich ist.
- In der Mitte der behandelten Warze können nach ein paar Tagen schwarze Punkte erscheinen.
- Halten Sie die behandelte Stelle sauber.
- Sie können schwimmen oder duschen.
- Kratzen Sie nicht an der behandelten Stelle, da dies zu einer Infektion führen kann.
- Schützen Sie bei Bedarf die Blasen mit einem Mull- oder sterilen Pflasterverband.
- Blasen nicht aufstechen. Das Aufstechen von Blasen ist schmerzhaft und kann zu einer Infektion führen.

Entsorgen Sie die Verpackung und die gebrauchten Teile gemäß den in Ihrem Land geltenden Vorschriften.

ENTSORGUNG VON SPRÜHDOSEN: Achten Sie darauf, dass Sprühdosen vor der Entsorgung vollständig entleert sind. Sprühdosen nicht anstechen, zerquetschen oder platt drücken. Entfernen Sie alle losen oder leicht abnehmbaren Teile, z. B. den Deckel, und entsorgen Sie diese mit ihrem übrigen recycelbaren Abfall. Bitte beachten Sie, dass die Spitze Schwermetalle enthält und möglicherweise entsprechend der örtlichen Gesetzgebung als Sondermüll entsorgt werden muss.

9. ANWENDUNGSDAUER
Als Anhaltspunkt gilt die folgende Anwendungsdauer:

	WARZEN-DURCHMESSER	BEHAND-LUNGSDAUER
Gewöhnliche Warzen und Dornwarzen an Zehen und Fußgewölbe	Kleiner als 2,5 mm (3/32 Zoll)	10 Sekunden
Gewöhnliche Warzen und Dornwarzen an Zehen und Fußgewölbe	2,5 – 5,0 mm (3/32 – 3/16 Zoll)	15 Sekunden
Gewöhnliche Warzen und Dornwarzen an Zehen und Fußgewölbe	Größer als 5,0 mm (3/16 Zoll)	20 Sekunden oder weniger
Verhornte Warzen an Fersen und Fußballen	Alle Größen	Maximal 40 Sekunden

10. ERKLÄRUNG DER SYMBOLE
Die Warnzeichen und -symbole auf der Verpackung und der Gebrauchsanweisung sind wichtig, um zu garantieren, dass Sie dieses Produkt sicher und korrekt anwenden und um Sie und andere vor Verletzungen zu schützen. Die Symbole werden in der nachstehenden Tabelle erläutert:

Symbol	Erläuterungn
	Symbol für den Hersteller
	Symbol für den Lieferanten
	Symbol, das darauf hinweist, die Gebrauchsanleitung zu konsultieren
	Symbol, das darauf hinweist, dass bei der Verwendung des Produkts Vorsicht geboten ist
	Symbol für das Verfallsdatum
	Symbol, das angibt, dass es sich bei dem Artikel um ein Medizinprodukt handelt
	Symbol für die eindeutige Produkterkennung
	Symbol für die Chargennummer
	Das Produkt muss zwischen 10 °C und 25 °C gelagert werden
	Das Symbol weist darauf hin, dass das Produkt vor Sonneneinstrahlung geschützt werden muss
	Nicht für Kinder im Alter von 3 Jahren und jünger